

Les pare-chocs labiaux (lips bumpers).



Lorsqu'ils touchent la gencive, vérifier s'il n'y a pas de gingivite due à l'accumulation de bactérie : **la gencive est alors rouge, souvent douloureuse et saigne au brossage** → Brosser la gencive avec assiduité.

Brosse ultra souple (brosse INAVA 15/100) en pharmacie, plus Arthrodont, bains de bouche associés.

Toujours vérifier que les pare-chocs ne fassent pas de marques verticales sur les gencives : Risque de déchaussement !

Dans ce cas :

- ôter les parechocs, prendre des photos
 - stopper le port du parechoc blessant durant 3 jours
 - puis refaire des photos de la gencive et remettre le parechoc ;
 - **nous adresser les photos sur notre boîte mail et par SMS pour plus de sûreté et nous contacter.**
- NB : ne pas oublier de remettre le parechoc.**

Protocole photographique. Prendre **3** photos intrabuccales de face :

- sur une photo, l'enfant serre les dents en faisant une grosse grimasse
- sur une 2^e il soulève sa lèvre supérieure **avec ses deux index en serrant les dents.**
- sur une 3^e il abaisse sa lèvre inférieure **avec ses deux index en serrant les dents**

Docteur Frédéric PIRONIN
Orthodontiste Vichy
Orthopédie dento-faciale

Cas des blessures des joues et lèvres : peuvent être dues à des reprises d'aspiration. - Il se peut que les parechocs aient été moins portés → les molaires supportant les appareils se sont avancées alors qu'elles ne devaient pas bouger grâce au port permanent, **ce qui provoque une perte de place indésirable à éviter absolument.**

Comme les molaires se sont avancées, le parechoc avance trop et devient gênant, ce qui conduit le patient à ne plus vouloir le porter.

Conduite à tenir : Bien porter les parechocs labiaux comme indiqué, ne pas aspirer les joues et et lèvres, vérifier qu'ils ne blessent pas la gencive.

Prévenir en cas de problèmes, photographies à l'appui.

Mail : f.pironin.ortho@wanadoo.fr tel : 07 82 17 95 64